-ежегодно прививайте всех сельскохозяйственных животных против сибирской язвы;

-при заболевании животных не допускайте вынужденного убоя на подворье без осмотра ветеринарного врача;

-при подозрении на заболевание сибирской язвой необходимо немедленно обратиться к врачу для получения экстренного профилактического лечения и медицинского наблюдения.

Помните! Только строгое соблюдение профилактических мер позволит защитить Вас от сибирской язвы!

Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества»

ПРОФИЛАКТИКА СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ

Тамбов 2016

Сибирская язва (или антракс) – это крайне опасное для человека инфекционное заболевание, при котором развивается специфическое серозно-геморрагическое поражение кожи и внутренних органов, а также сильная интоксикация. Свое название данная патология получило из-за широкого распространения в дореволюционное время в Сибири, а также из-за того, что наиболее частой формой недуга является кожная форма, проявляющаяся язвами на теле.

Источником сибирской язвы для человека являются больные животные (их туши, шкуры), и выделяемые ими в окружающую среду продукты жизнедеятельности. Кроме того, опасность представляет почва, в которой содержатся сибиреязвенные споры.

В зависимости от того, каким путем в организм человека проник возбудитель, могут развиться ***три формы болезни:***

При попадании микроорганизмов на кожу, особенно имеющую ссадины и микротравмы, – **кожная.**

При вдыхании сибиреязвенных спор – **легочная.**

При проглатывании возбудителя – **желудочно-кишечная**.

Симптомы:

Средний инкубационный период продолжается 2-3 дня, однако при попадании в организм человека большого количества спор возбудителя или при проникновении их через значительные повреждения на коже этот отрезок времени может укорачиваться до суток.

При кожной форме болезни у больного появляются следующие симптомы:

- в месте проникновения возбудителя образуется небольшое красное пятно как от укуса насекомого. Далее за короткое время это пятно преобразуется в прыщик, пузырек, карбункул, после вскрытия которого остается язва с черным струпом. Весь этот процесс сопровождается сильным зудом, покраснением окружающих тканей и утратой их чувствительности;
- воспаление лимфатических узлов;
- общая интоксикация;
- лихорадка.

При легочной форме сибирской язвы развиваются следующие симптомы:

- непрекращающаяся лихорадка, озноб;
- резкое снижение артериального давления;
- кашель с желеобразной кровавой мокротой;
- сильная интоксикация;
- удушье;
- боль в грудной клетке.

При проникновении возбудителя сибирской язвы в желудочно-кишечный тракт, помимо общей интоксикации, гипотензии и лихорадки, у человека появляется:

- резкая режущая боль в животе;
- кровавая рвота;
- диарея с примесью крови.

Меры профилактики — чтобы уберечь себя от заражения сибирской язвой, необходимо соблюдать следующее:

-соблюдайте правила личной гигиены;

-никогда не покупайте мясо и мясные продукты на стихийных рынках, на улицах;